

1. Sopaenvino, Siempreviva (*Limonium sp.*)

Su nombre se debe al color rosado de sus flores, que se mantienen mucho tiempo sin marchitarse (secas). Planta perenne de 40-80 cm de altura, de tallos delgados, flexibles y ramificados a partir de media altura, con varios grupillos de flores dispuestas en pequeñas espigas. Típica de saladares, terrenos abiertos y descarnados con elevado contenido en sales.



Sopaenvino - *Limonium caesium*

2. Palmera de rambla (*Phoenix iberica*)

Muy parecida a la palmera datilera, pero con frutos más pequeños y de peor calidad. Estas palmeras son apreciadas por los palmereros para el macheo porque los individuos masculinos tienen flores con gran cantidad de polen.



Palmera iberica - *Phoenix iberica*

4. Sosa alacranera (*Salicornia fruticosa*)

Planta adaptada a vivir en zonas con alta concentración de sales, las cuales acumula en sus tejidos. De estas plantas se obtenía carbonato de sodio (sosa o álcali), utilizado antiguamente en la producción de jabones y vidrios.



Sosa alacranera - *Salicornia fruticosa*

5. Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)

Ave rapaz de mediano tamaño y formas particularmente esbeltas, se caracteriza por sus alas largas, estrechas y relativamente puntiagudas y su larga cola. Es fácil observarlo planeando a baja altura, con un vuelo muy grácil y habilidoso en el que mantiene las alas colocadas en forma de "V". Su presa favorita son ratones y topillos, pero también caza lagartijas, culebras y aves pequeñas y medianas. Complementa su dieta con grandes cantidades de insectos, especialmente langostas y saltamontes.



Aguilucho cenizo - *Circus pygargus*

6. Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*)

Ave inconfundible por su particular aspecto. Destacan sus largas patas rojas, y el pico largo y fino. Frecuenta humedales de aguas someras, saladares, marjales, lagunas estacionales y orillas de ríos. Su dieta se basa en invertebrados, principalmente insectos acuáticos a los que captura de un rápido picotazo mientras están posados en la superficie.



Cigüeñuela común - *Himantopus himantopus*

7. Chorlitojeo patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Pequeña ave limícola de movimientos nerviosos. Con pico corto y en punta, y patas muy oscuras. Nidifica en playas arenosas y en lagunas saladas de interior con poca cobertura vegetal. Se alimenta de insectos (escarabajos, moscas, hormigas e invertebrados acuáticos), así como diferentes crustáceos, lombrices y moluscos, en las zonas saladas.



Chorlitojeo patinegro - *Charadrius alexandrinus*

3. Taray (*Tamarix boveana*)

Arbusto o arbolillo muy ramificado, de ramas largas y muy flexibles, desde la base o cerca de ella, y que puede llegar a una altura de 8 metros. Entre septiembre y mayo, aparecen las flores agrupadas en espigas de color rosado-blanco. Tiene preferencia por suelos salinos húmedos y por márgenes de ríos, arroyos y en los cauces de las ramblas en terrenos secos, calurosos y de mucha luz.



Taray - *Tamarix boveana*

9. Fartet (*Aphanius iberus*)

Pez de pequeño tamaño y de aguas salobres. Es una especie endémica, exclusiva de la Península Ibérica, presente en la Región de Murcia. Especie en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitats idóneos. Se alimenta de larvas de insectos.



Fartet - *Aphanius iberus*

10. Sapo de espuelas (*Pelobates cultripes*)

Sapo que llega a los 7 cm en ejemplares adultos. Recibe su nombre por una especie de espolones negros que presenta en las patas traseras. Sapo adaptado a ecosistemas áridos, es capaz de excavar galerías para esconderse.



Sapo de espuelas - *Pelobates cultripes*

Su distribución se ve reducida debido a la desaparición progresiva de charcas temporales, que necesita para su reproducción.

11. Lagarto ocelado (*Lacerta lepida*)

Es el mayor de los lagartos europeos, con unos 15 cm, sin contar la cola. También posee una coloración especial, siendo de tono verdoso, con unas manchas características redondeadas, denominadas ocelos, por las que recibe su nombre, y que van del castaño, al azulado en adultos. Presente en todo tipo de hábitats, está especialmente ligado a zonas secas de espartal, matorral y ramblas.



Lagarto ocelado - *Lacerta lepida*

8. Cortanarices o Caballito azulado de mercurio (*Coenagrion mercuriale*)

Emparentado con las libélulas, se trata de un pequeño Caballito del Diablo de color azul. Como curiosidad, recibe su nombre por la marca negra semejante al casco del dios Mercurio, visible en el abdomen de los machos. Se aleja poco del agua, con vuelo lento, corto y raso sobre el agua, posándose muy a menudo. Suele aparecer en grupos reducidos.



Cortanarices - *Coenagrion mercuriale*

12. Murciélago enano (*Pipistrellus pipistrellus*)

Uno de los murciélagos más pequeños de la península, y de los que mejor se adapta a las construcciones de origen humano. Se alimentan de gran variedad de invertebrados, que cazan al vuelo, con una trayectoria más o menos fija que recorren en ambos sentidos.



Murciélago enano - *Pipistrellus pipistrellus*